

# BON USAGE DES PANSEMENTS

CLASSE	PROPRIETES	INDICATIONS	UTILISATION	REFERENCES & LABORATOIRES	Possibilité Remboursement	CONTRE INDICATIONS Janvier 2009	
<b>HYDROCOLLOIDES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorbe les exsudats</li> <li>Forme un gel</li> <li>Non adhérent à la plaie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur la plaie en débordant de 2-3 cm</li> <li>Laisser en place jusqu'à aspect translucide 1 cm autour de la plaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algoplaque/Urgomed®</li> <li>Askina biofilm®</li> <li>Comfeel®</li> <li>Duoderm®</li> <li>Hydrocoll®</li> <li>Sureskin®</li> <li>Tegasorb®</li> <li>Suprasorb H®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urgo</li> <li>B. Braun</li> <li>Coloplast</li> <li>Convatec</li> <li>Hartmann</li> <li>Euromedex</li> <li>3M</li> <li>Lohmann Rauscher</li> </ul>	OUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaie infectée</li> </ul>
<b>HYDROGELS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydrate la plaie</li> <li>Ramollit la nécrose</li> <li>Stimule le processus de déterision</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer 5 mm d'épaisseur d'hydrogel sur la plaie sans débordant en peau saine</li> <li>Couvrir par pansement secondaire (film polyuréthane)</li> <li>Changement : 48 à 72h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Askinagel®</li> <li>Duoderm gel®</li> <li>Hydrosorb®</li> <li>Intrasite gel®</li> <li>Normgel/Hypergel®</li> <li>Nu-Gel®</li> <li>Purilon®</li> <li>Urgo hydrogel®</li> <li>Sureskin hydrogel®</li> <li>Suprasorb G®</li> <li>Hydroclean®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>B. Braun</li> <li>Convatec</li> <li>Hartmann</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Mölnlycke</li> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Coloplast</li> <li>Urgo</li> <li>Euromedex</li> <li>Lohmann Rauscher</li> <li>Hartmann</li> </ul>	OUI (sauf certaines tailles Suprasorb®)	
<b>HYDROCELLULAIRES</b> 3 Couches : - Face interne : micro perforée - Couche mousse hydrophile - Face externe : film polyuréthane hydrophobe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorbe 10 fois son poids</li> <li>Pas de macération</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer en dépassant 2-3 cm</li> <li>Renouveler à saturation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allewyn®</li> <li>Askina transorbent®</li> <li>Biatain®</li> <li>Cellosorb®</li> <li>Combiderm®</li> <li>Cutinova®</li> <li>Lyomousse®</li> <li>Mepilex®</li> <li>Tielle®</li> <li>Permafoam®</li> <li>Suprasorb P®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>B. Braun</li> <li>Coloplast</li> <li>Urgo</li> <li>Convatec</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Seton Healthcare</li> <li>Mölnlycke</li> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Hartmann</li> <li>Lohmann Rauscher</li> </ul>	OUI (Sauf Tielle Lite® 7*9cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Précaution : plaie sèche ou infectée</li> </ul>
<b>ALGINATES</b> Extrait d'algue brune	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorbe 15 fois son poids</li> <li>Maintient le milieu humide</li> <li>Hémostatique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Poser alginate : - sur plaie infectée - sur plaie exsudative - sur plaie hémorragique</li> <li>Humidifier avec Sérum physiologique (Sauf si exsudat ou hémorragie importante)</li> <li>Renouveler à saturation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algisite M®</li> <li>Algotérial®</li> <li>Askinasorb®</li> <li>Melgisorb®</li> <li>Seasorb soft®</li> <li>Sorban®</li> <li>Sorbalgon®</li> <li>Suprasorb A®</li> <li>Urgosorb®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Brothier</li> <li>B. Braun</li> <li>Mölnlycke</li> <li>Coloplast</li> <li>B. Braun</li> <li>Hartmann</li> <li>Lohmann &amp; Rauscher</li> <li>Urgo</li> </ul>	OUI (Sauf Algisite M®, Suprasorb A®, Algotérial 30cm®)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas associer à des solutions alcalines</li> <li>Ne pas appliquer sur nécrose sèche</li> </ul>
<b>HYDROFIBRES</b> 100% fibres hydrocolloïdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorbe 30 fois son poids</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas humidifier</li> <li>Mettre sur plaie exsudative (infectée ou non)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquacel®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convatec</li> </ul>	OUI	
<b>TULLES NEUTRES</b> Trame à large maille + corps gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintient milieu humide</li> <li>Non absorbant</li> <li>+/- adhérent</li> <li>Sèche rapidement</li> <li>Risque arrachement bourgeon</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur plaie peu exsudative</li> <li>Appliquer 2 couches en débordant légèrement</li> <li>Renouvellement : 48 à 72 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grassilind neutral®</li> <li>Jelonet®</li> <li>Lomatuell H®</li> <li>Tulle gras Solvay®</li> <li>Vaselitulle®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hartmann</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Lohmann &amp; Rauscher</li> <li>Solvay pharma</li> <li>Solvay pharma</li> </ul>	OUI (Sauf certaines tailles de Lomatuell H®)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaie exsudative</li> </ul>
<b>TULLES avec PRINCIPE ACTIF</b> Trame à large maille + corps gras + principe actif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idem + propriétés du principe actif</li> </ul>	Indication dépendante du principe actif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antiseptique</li> <li>Huiles essentielles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bétadine Tulle®</li> <li>Biogaze®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MedaPharma</li> <li>Zambon France</li> </ul>	NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de sensibilisation sur utilisation chronique</li> </ul>
<b>INTERFACES</b> Trame serrée + substance neutre +/- CMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adhérent (indolore au retrait et respect du bourgeon)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer en débordant légèrement</li> <li>Renouvellement : 2 à 7 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptic®</li> <li>Atrauman®</li> <li>Cuticerin®</li> <li>Mepitel®</li> <li>Physiotulle®</li> <li>Urgotul®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Hartmann</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Mölnlycke</li> <li>Coloplast</li> <li>Urgo</li> </ul>	OUI (Sauf Adaptic doigtier®, ni Atrauman®)	
<b>PANSEMENT au CHARBON</b> Tissu ou tricot de charbon actif +/- couche absorbante +/- enveloppe en non tissé +/- argent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adhérent</li> <li>Absorbe exsudats</li> <li>Inactive les germes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas découper le pansement</li> <li>S'applique sec ou humidifié (Sérum physiologique)</li> <li>Renouveler à saturation ou tous les jours si infecté</li> <li>Peut être utilisé en pansement secondaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actisorb Ag+®</li> <li>Askina carbosorb®</li> <li>Carboflex®</li> <li>Carbonet®</li> <li>Vliwaktiv®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>B. Braun</li> <li>Convatec</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Lohmann &amp; Rauscher</li> </ul>	OUI (Sauf Vliwaktiv®)	
<b>PANSEMENT à l'Ag+</b> - Concentration d'Ag variable - Ag diffusé ou non	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bactéricide si forme ionisée</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation différente selon produit (voir notice)</li> <li>Ex : Acticoat® : humecter avec eau stérile (Cl avec le sérum physiologique) et maintenir humide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acticoat®</li> <li>Acticoat absorbent®</li> <li>Calgitrol Ag+®</li> <li>Actisorb Ag+®</li> <li>Aquacel Ag+®</li> <li>Altreat Ag+®</li> <li>Biatain Ag+®</li> <li>laluset plus®</li> <li>Release Ag+®</li> <li>Urgotul Ag+®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>B. Braun</li> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Convatec</li> <li>Coloplast</li> <li>Coloplast</li> <li>Genevrier</li> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Urgo</li> </ul>	NON OUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie</li> <li>Argyrisme?</li> <li>Cytotoxicité?</li> </ul>
<b>PANSEMENT à l'ACIDE HYALURONIQUE</b> - Existe en crème, compresses imprégnées, spray, feuilles, micro granules	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prolifération et migration cellulaire</li> <li>Moderation de l'inflammation</li> <li>Favorise l'angiogenèse</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la plaie</li> <li>Appliquer : - 1 couche crème ou poudre si profond - 1 compresse ou feuille si superficiel</li> <li>Renouvellement 24h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effidia®</li> <li>Hyalogran®</li> <li>Hyalofill F®</li> <li>Hyalofill R®</li> <li>laluset®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Convatec</li> <li>Convatec</li> <li>Convatec</li> <li>Genevrier</li> </ul>	OUI (Sauf Effidia spray® ni gamme Hyalofill®)	
<b>PANSEMENT avec INHIBITEUR de PROTEASE</b> +/- collagène	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorise la cicatrisation dirigée</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la plaie</li> <li>Mettre le pansement en place (après humidification pour le Promogran®)</li> <li>Recouvrir d'un pansement secondaire et maintenir l'humidité</li> <li>Renouvellement 1 à 2 fois par semaine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catrix®</li> <li>Promogran®</li> <li>Suprasorb C®</li> <li>Celostart® (sans collagène)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valeant</li> <li>Johnson &amp; Johnson</li> <li>Lohmann &amp; Rauscher</li> <li>Urgo</li> </ul>	NON (Sauf Celostart®)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tissu nécrotique</li> <li>Plaie infectée</li> </ul>
<b>FILMS AUTO-ADHESIFS</b> Film transparent en polymère de synthèse (polyuréthane) enduit d'une masse adhésive hypoallergénique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imperméable à l'eau mais laisse s'évaporer la vapeur d'eau</li> <li>Imperméable aux bactéries</li> <li>Protège du cisaillement et du frottement</li> <li>Transparent : contrôle visuel de la plaie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Renouvellement 1 à 2 fois par semaine</li> <li>En prévention des escarres</li> <li>Plaie superficielle non exsudative</li> <li>A appliquer sur peau propre et sèche</li> <li>NB : pour retirer le pansement, étirer le film parallèlement à la peau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Askinaderm®</li> <li>Dermofilm®</li> <li>Hydrap-ex®</li> <li>Hydrofilm®</li> <li>Opsite®</li> <li>Optiskin®</li> <li>Suprasorb F®</li> <li>Tegaderm®</li> <li>Visulin®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>B. Braun</li> <li>VYGON</li> <li>Hydrex</li> <li>Hartmann</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Urgo</li> <li>Lohmann &amp; Rauscher</li> <li>3M</li> <li>Hartmann</li> </ul>	OUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaie infectée</li> </ul>



Coûts approximatifs pour traiter une plaie de 100 cm<sup>2</sup> d'après les tarifs des pansements disponibles APHM 2008/2009:  
 Moins de 0,5 euros : €  
 De 0,5 à 1,5 euros : €€  
 Plus de 6 euros : €€€€  
 Plus de 8 euros : €€€€€

PR : Prescription restreinte après avis spécialisé



Assistance Publique  
Hôpitaux de Marseille

Auteurs : Nguyen P, Wolber A, Degardin N, Ausias N, Duquennoy Martinot V, Magalon G - Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique - CHU Marseille / CHU Lille  
26 avril 2010

