

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Experts working group of the Research Network of the European Association for Palliative Care. *BMJ* 2001;34(5):587-93.
- FNCLCC (Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer). Standard, Options, Recommandations (SOR) pour les traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses pour excès de nociception chez l'adulte, mise à jour du rapport original 1996. *Bull Cancer* 2002;89(12):1067-74.
- Opioides forts et douleurs liées au cancer : quelles galéniques et quelles équianalgésies ? N. Béziaud, J.M. Pellat, M.L. Villard, K. Liatard, G. Laval. *Med Pal* 2009;8:27-34.
- Douleurs chroniques, accès douloureux paroxystiques (ADP) : les challenges. L. Labreze, T. Delorme, P. Poulain. *Douleurs* 2009;10:185-91.
- Recommandations pour l'utilisation de l'Oxycotin® (chlorhydrate d'oxycodone). « Dossier produit » - Mundipharma - 2002.
- Bon usage des dispositifs transdermiques de fentanyl. Groupe de travail de la SFAP - SFETD. www.sfap.org
- Diagnostic et traitement des accès douloureux paroxystiques dans la douleur cancéreuse. JM. Pellat, H. Hodaj, M. Guez, JP. Alibeu. *Douleurs* 2006;7:295-301.
- Recommandations pour l'utilisation de la Sophidone® (chlorhydrate d'hydromorphone). « Dossier produit » - UPSA - 1999.
- Abstral®, Résumé des Caractéristiques du Produit 2009.
- Recommandations pour l'utilisation de l'Actiq® (fentanyl transmuqueux). « Dossier produit » - Lafon - 2002.
- Commission européenne. « Résumé des caractéristiques du produit – Effentora® » 04 avril 2008.
- Commission européenne. « Résumé des caractéristiques du produit – Instanyl® » 20 juillet 2009.

Réactualisation :

Dr N. BEZIAUD - Dr G. LAVAL

Clinique de Soins Palliatifs et de Coordination en Soins de Support
CHU de Grenoble

Avec le soutien de la
**Société Française
d'Accompagnement
et de Soins Palliatifs**
www.sfap.org



PRINCIPAUX OPIOÏDES FORTS ET DURÉE MAXIMALE DE PRESCRIPTION

Spécialités concernées	Formes	Durée maximale
<ul style="list-style-type: none"> Chlorhydrate et sulfate de morphine injectable Amp 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 400 - 500 mg Chlorhydrate d'oxycodone injectable OKYNORM® amp 10 - 20 - 50 - 200 mg 	<p>Ampoules injectables administrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sans système actif pour perfusion • avec système actif (PSE, PCA) 	<p>7 jours</p> <hr/> <p>28 jours</p>
<ul style="list-style-type: none"> Morphine solution buvable, amp 10 et 20 mg Morphine solution buvable, flacons préparés en officine (concentration adaptable) Sulfate de morphine SEVREDOL® cp sécable 10 - 20 mg ACTISKENAN® gel 5 - 10 - 20 - 30 mg ORAMORPH® soluté en récipients unidoses, 10 - 30 - 100 mg/5 ml ORAMORPH® solution compte-gouttes 20 mg/ml (4 gouttes = 5 mg) Chlorhydrate d'oxycodone OKYNORM® gél 5 - 10 - 20 mg OKYNORMORO® cp orodispersibles 5 - 10 - 20 mg 	Formes orales à libération immédiate (LI)	28 jours
<ul style="list-style-type: none"> Sulfate de morphine MOSCONTIN® cp 10 - 30 - 60 - 100 - 200 mg SKENAN® gél 10 - 30 - 60 - 100 - 200 mg Chlorhydrate d'oxycodone OKYCONTIN® cp 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 120 mg TARGINACT®* (oxycodone / naloxone) cp 5/2,5 - 10/5 - 20/10 - 40/20 mg Chlorhydrate d'hydromorphone SOPHIDONE® gel 4 - 8 - 16 - 24 mg 	Formes orales à libération prolongée (LP)/12h	
<ul style="list-style-type: none"> Sulfate de morphine KAPANOL® gél 20 - 50 - 100 mg 	Formes orales à libération prolongée (LP)/24h	
<ul style="list-style-type: none"> Fentanyl ABSTRAL® cp sublingual 100 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 µg ACTIQ® cp pour application buccale transmuqueuse 200 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1600 µg EFFENTORA® cp gingivaux 100 - 200 - 400 - 600 - 800 µg INSTANYL®* sol pour pulvérisation nasale 50 - 100 - 200 µg 	Formes transmuqueuses à libération immédiate (LI)	<p><i>Délivrance fractionnée</i></p> <p>7 jours</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fentanyl DUROGESIC® patch 12 - 25 - 50 - 75 - 100 µg/h FENTANYL RATIOPHARM® patch 12 - 25 - 50 - 75 - 100 µg/h FENTANYL SANDOZ® patch 12 - 25 - 50 - 75 - 100 µg/h FENTANYL WINTHROP® patch 25 - 50 - 75 - 100 µg/h MATRIFEN® patch 12 - 25 - 50 - 75 - 100 µg/h 	Dispositifs transdermiques à libération prolongée (LP)/72h	<p><i>Délivrance fractionnée</i></p> <p>14 jours</p>

FÉDÉRATION DES ACTIVITÉS
DE SOINS PALLIATIFS
ET DE SOINS DE SUPPORT
DU CHU DE GRENOBLE

TABLE PRATIQUE D'ÉQUIANTALGIE DES OPIOÏDES FORTS DANS LA DOULEUR CANCÉREUSE PAR EXCÈS DE NOCICEPTION



**CLINIQUE DE SOINS PALLIATIFS
ET DE COORDINATION
EN SOINS DE SUPPORT**

B. P. 217
38043 GRENOBLE Cedex 9
Tél: 04 76 76 76 97 - 04 76 76 56 67
coordinationsupport@chu-grenoble.fr
soinspalliatifs@chu-grenoble.fr

Table pratique d'équianalgie des opioïdes forts dans la douleur cancéreuse par excès de nociception (ratio calculé à partir du passage par la morphine orale)

1 morphine orale = 1/2 morphine SC = 1/3 morphine IV - Délais action approximatifs de morphine LI : Per os : 40 mn, SC : 20 mn, IV : 10 mn.
 1 morphine orale = 1/2,4 fentanyl transdermique (pour un ratio de 1/100) = 1/7,5 hydromorphone orale = 1/2 oxycodone orale.
 1 morphine IV = 1 oxycodone IV ou SC.
 1 oxycodone orale = 1/2 oxycodone SC ou IV (en pratique, le ratio d'équianalgie est entre 1/2 et 1 du fait de la variabilité inter-individuelle).

Version 5 - Janvier 2010
 Fédération soins de support - soins palliatifs - CHU de Grenoble
 coordinationsupport@chu-grenoble.fr - soinspalliatifs@chu-grenoble.fr

Morphine en mg									Oxycodone en mg						Hydromorphone en mg		Fentanyl en µg						
PO			SC			IV			PO			SC - IV			PO		Transdermique	Transmuqueux					
Dose / 24h	Dose du bolus**		Dose par 24 heures	Dose du bolus**		Dose par 24 heures	Dose du bolus**		Dose / 24h	Dose / 24h	Dose du bolus**		Dose par 24 heures	Dose du bolus**		Dose / 24h		Dose / 72h	Dose du bolus				
Moscontin cp LP Skénan gel LP 10 - 30 - 60 100 - 200 mg	Actiskénan gel LI 5 - 10 - 20 - 30 mg Sévedrol cp LI 10 - 20 mg Oramorph sol buv unidose LI 10 - 30 - 100 mg/5ml			1/10	1/6		1/10	1/6	1/10	1/6	OxyContin cp LP 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 120 mg	Targinact* (oxycodone / naloxone) cp LP 5/2,5 - 10/5 - 20/10 - 40/20 mg		OxyNorm gel LI 5 - 10 - 20 mg	OxyNormORO cp orodispersible LI 5 - 10 - 20 mg	1/10	1/6	1/10	1/6	Sophidone gel LP 4 - 8 - 16 - 24 mg		Durogésic Fentanyl Ratiopharm Fentanyl Sandoz Fentanyl Winthrop Matrifen patch 12 - 25 - 50 75 - 100 µg/h	Abstral cp sublingual 100 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 µg Actiq appl. buccal 200 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1600 µg
	1/10	1/6																		1/10	1/6		
20	2	3,5	10	1	1,5	6,5	0,5	1	10	10	1	1,5	6,5	0,5	1								
30	3	5	15	1,5	2,5	10	1	1,5	15	15	1,5	2,5	10	1	1,5		12		Effortora cp gingival 100 - 200 - 400 - 600 - 800 µg				
60	6	10	30	3	5	20	2	3	30	30	3	5	20	2	3		8	25					
90	9	15	45	4,5	7,5	30	3	5	45	45	4,5	7,5	30	3	5			37					
120	12	20	60	6	10	40	4	7	60	60	6	10	40	4	7		16	50	Instanyl* pulv nasal 50 - 100 - 200 µg				
160	16	27	80	8	13	53	5	9	80	80	8	13	53	5	9								
180	18	30	90	9	15	60	6	10	90	80 + 10 [▲]	9	15	60	6	10		24	75					
200	20	33	100	10	17	67	7	11	100	80 + 20 [▲]	10	17	67	7	11								
240	24	40	120	12	20	80	8	13	120	80 + 40[▲]	12	20	80	8	13		32	100					
280	28	47	140	14	23	93	9	16	140	80 + 60 [▲]	14	23	93	9	16								
300	30	50	150	15	25	100	10	17	150	80 + 70 [▲]	15	25	100	10	17		40	125					
360	36	60	180	18	30	120	12	20	180	80 + 100[▲]	18	30	120	12	20		48	150					
400	40	67	200	20	33	133	13	22	200	80 + 120 [▲]	20	33	133	13	22								
480	48	80	240	24	40	160	16	27	240	80 + 160 [▲]	24	40	160	16	27		64	200					
540	54	90	270	27	45	180	18	30	270	80 + 190 [▲]	27	45	180	18	30		72	225					
600	60	100	300	30	50	200	20	33	300	80 + 220[▲]	30	50	200	20	33		80	250					
720	72	120	360	36	60	240	24	40	360	80 + 280 [▲]	36	60	240	24	40		96	300					
900	90	150	450	45	75	300	30	50	450	80 + 370 [▲]	45	75	300	30	50		120	375					
1000	100	167	500	50	83	333	33	56	500	80 + 420 [▲]	50	83	333	33	56			412					

* À paraître. ** Dose du supplément = 1/6 à 1/10 de la dose totale par 24 heures par la même voie. LP = Libération prolongée = durée d'action 12 h. LI = Libération immédiate = durée d'action 4 à 6h.

▲ Au-delà d'une dose de 80 mg par 24h, l'augmentation de la posologie se fait en associant OxyContinLP à Targinact.

Pas de règles entre la dose du bolus et celle du traitement opioïde de fond. La dose initiale doit être le plus faible dosage avec augmentation de la posologie, si nécessaire, jusqu'à l'obtention de la dose procurant une antalgie efficace avec une seule unité par accès douloureux paroxystique (Cf. AMM).