



NEWSLETTER OMEDIT PACA-CORSE

OMEDIT PACA-CORSE

Direction de l'Organisation de l'Offre de soins
Agence Régionale de Santé PACA
132 Boulevard de PARIS
13003 MARSEILLE
Mail: OMEDIT-PACA-CORSE@sante.gouv.fr

JANVIER 2016



Les vœux de l'OMÉDIT

Dans ce numéro

- 1 A la une: vœux 2016
- 1 Nouveau R.E. numérique
- 2 Dépenses produits listes en sus
- 3 Liste RTU mòi



L'OMÉDIT PACA
Corse vous
présente ses
meilleurs vœux
pour l'année 2016



LE NOUVEAU RAPPORT D'ETAPE DU CBU 2015 ARRIVE !

Le nouveau formulaire numérique sera disponible mi-janvier.

Vous recevrez un mail explicatif avec :

- le lien vers le R.E. numérique
- un guide utilisateur version PDF


Avant ouverture, lire attentivement le guide utilisateur en pièce jointe.

Dès l'ouverture du rapport d'étape numérique, il sera nécessaire de créer votre mot de passe et votre propre login afin de pouvoir accéder à votre document, à tout moment.

Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail !



TABLEAU DE BORD DES DEPENSES PRODUITS DE LA LISTE EN SUS (PACA) à M9 2015



Evolution des dépenses M9 2015 / M9 2014

	Etablissements publics	Etablissements privés	Ensemble des établissements
MO	6,9%	-4,0%	5,1%
DMI	5,2%	1,8%	3,4%
MO + DMI	6,4%	-0,2%	4,4%

Liste des Spécialités faisant actuellement l'objet d'une RTU (MàJ 04/01/16)

Spécialité	DCI	Date d'octroi de RTU	Indications concernées par la RTU
TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé Laboratoire GILEAD SCIENCES	emtricitabine + ténofovir	RTU - Etablie le 25/11/2015 Début le 31/12/2016	Prophylaxie préexposition au VIH chez les personnes âgées de 18 ans et plus à haut risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle en tant qu'outil additionnel d'une stratégie de prévention diversifiée.
STELARA 45 mg, solution injectable en flacon STELARA 90 mg, solution injectable en seringue préremplie	Ustekinumab	RTU - Octroyée le 20/11/2015 Début le 25/11/2015	Traitement de la maladie de Crohn modérée à sévère chez les patients adultes en échec à l'infliximab, à l'adalimumab et au védoluzimab, ou qui sont intolérants, ou qui ont une contre-indication à ces traitements
AVASTIN 25mg/ml, solution à diluer pour perfusion	Bevacizumab	RTU - Etablie le 24/06/2015 Début le 01/09/2015	Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge
CIRCADIN 2mg, comprimé à libération prolongée	Mélatonine	RTU - Octroyée le 08/07/2015 Début le 01/10/2015	Traitement des troubles du rythme veille-sommeil liés à un syndrome de Rett, un syndrome de Smith-Magenis, un syndrome d'Angelman, une sclérose tubéreuse ou à des troubles du spectre autistique chez l'enfant de plus de 6 ans
Spécialités orales à base de Vérapamil ISOPTINE 40 mg cp enrobé, ISOPTINE 120mg gélule, ISOPTINE LP 240mg cp pelliculé sécable à libération prolongée, et génériques	Vérapamil	RTU - Octroyée le 03/08/2015 Début le 05/10/2015	Traitement prophylactique de l'algie vasculaire de la face
LIORESAL 10 mg, comprimé sécable - BACLOFENE Zentiva 10 mg, comprimé	Baclofène	RTU - Début le 17/03/2014	Aide au maintien de l'abstinence après sevrage chez les patients dépendants à l'alcool et en échec des Réduction majeure de la consommation d'alcool jusqu'au niveau faible de la consommation telle que défini par l'OMS chez des patients alcoolo-dépendants à haut risque et en échec des traitements
REMICADE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	Infliximab	RTU - Octroyée le 04/07/2014 Début le 27/10/2014	Traitement de la maladie de Takayasu réfractaire aux traitements conventionnels
ROACTEMRA, 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion	Tocilizumab	RTU - Début le 07/04/2014	Traitement de la maladie de Castleman inflammatoire (à CRP élevée) non associée au virus HHV8
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule	Thalidomide	RTU - Octroyée le 05/05/2015 Début prévu le 08/06/2015	Traitement des aphoses sévères, y compris chez les patients HIV positifs et dans la maladie de Behçet, en cas d'échec aux traitements de 1 ^{ère} intention (traitements locaux et colchicine), Traitement des formes cutanées du lupus érythémateux, y compris la maladie de Jessner-Kanof, en 2 ^{ème} ligne après échec des antipaludéens de synthèse (hydroxychloroquine et chloroquine), Traitement des formes aiguës sévères de l'érythème noueux lépreux (réaction lépreuse de type II). Traitement de la maladie de Crohn active, sévère chez les enfants de plus de 6 ans qui n'ont pas répondu à un traitement approprié et bien conduit par corticoïde, immunosuppresseur ou anti-TNF ou chez lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés.
VELCADE 1 mg, poudre pour solution VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution	Bortézomib	RTU octroyée le 02/03/2015 Début le 02/04/2015	Traitement de l'Amylose AL non IgM et de la maladie de Randall

