



NEWSLETTER OMEDIT PACA-CORSE

OMEDIT PACA-CORSE

Direction de l'Organisation de l'Offre de soins
Agence Régionale de Santé PACA
132 Boulevard de PARIS
13003 MARSEILLE

Mail: OMEDIT-PACA-CORSE@sante.gouv.fr

JUILLET 2015

Dans ce numéro

- 1 A la une: les AGORAS
- 1 Twitter et site internet
- 2 Dépenses produits
- 3 Thérapies ciblées
- 3 Liste RTU

A la une: les AGORAS



Inscriptions sur <http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/>



Nouveauté: suivez-nous sur Twitter !

L'OMEDIT Paca-Corse est désormais sur Twitter.

Vous pouvez nous suivre à cette adresse:

<https://twitter.com/OmeditPacaCorse>



Sans oublier notre site internet !


<http://omedit.e-santepaca.fr/>

De nombreux documents et informations mises à jour sont disponibles sur le site internet de l'OMEDIT Paca-Corse.

TABLEAU DE BORD DES DEPENSES PRODUITS DE LA LISTE EN SUS (PACA)

Evolution de 2006 à 2014


DEPENSES DES PRODUITS DE LA LISTE EN SUS EN PACA (étab. publics)




DEPENSES DES PRODUITS DE LA LISTE EN SUS EN PACA (étab. privés)



DEPENSES DES PRODUITS DE LA LISTE EN SUS EN PACA Comparaison 1^{er} trimestre 2015 / 2014



Principales thérapies ciblées



Liste des Spécialités faisant actuellement l'objet d'une RTU (MâJ 03/08/15)

Spécialité	DCI	Indications concernées par la RTU
AVASTIN 25mg/mL, solution à diluer pour perfusion	Bevacizumab	Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge
CIRCADIN 2mg, comprimé à libération prolongée	Mélatonine	Traitement des troubles du rythme veille-sommeil liés à un syndrome de Rett, un syndrome de Smith-Magenis, un syndrome d'Angelman, une sclérose tubéreuse ou à des troubles du spectre autistique chez l'enfant de plus de 6 ans
LIORESAL 10 mg, comprimé sécable - BACLOFENE Zentiva 10 mg, comprimé	Baclofène	Aide au maintien de l'abstinence après sevrage chez les patients dépendants à l'alcool et en échec des autres traitements disponibles Réduction majeure de la consommation d'alcool jusqu'au niveau faible de la consommation telle que défini par l'OMS chez des patients alcoolo-dépendants à haut risque et en échec des traitements disponibles
ROACTEMRA, 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion	Tocilizumab	Traitement de la maladie de Castleman inflammatoire (à CRP élevée) non associée au virus HHV8
REMICADE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	Infliximab	Traitement de la maladie de Takayasu réfractaire aux traitements conventionnels
VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable	Bortézomib	Traitement de l'Amylose AL non IgM et de la maladie de Randall
VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable		
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule	Thalidomide	Traitement des aphtoses sévères, y compris chez les patients HIV positifs et dans la maladie de Behçet, en cas d'échec aux traitements de 1 ^{ère} intention (traitements locaux et colchicine), Traitement des formes cutanées du lupus érythémateux, y compris la maladie de Jessner-Kanof, en 2 ^{ème} ligne après échec des antipaludéens de synthèse (hydroxychloroquine et chloroquine), Traitement des formes aiguës sévères de l'érythème noueux lépreux (réaction lépreuse de type II). Traitement de la maladie de Crohn active, sévère chez les enfants de plus de 6 ans qui n'ont pas répondu à un traitement approprié et bien conduit par corticoïde, immunosuppresseur ou anti-TNF ou chez lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés.