





➤ Traitement CURATIF dans la COVID-19

❖ *Résumé des caractéristiques du produit*

1. Présentation

Casirivimab et Imdevimab : solutions transparentes à légèrement opalescentes, incolores à jaune pâle.

	Casirivimab	Imdevimab
Flacon 20ml (120mg/ml)	1332mg (11,1ml) 	1332mg (11,1ml) 
Flacon 6ml (120mg/ml)	300mg (2,5ml) 	300mg (2,5ml) 

2. Posologie : à réserver aux infections DELTA

Le traitement doit être initié le plus rapidement possible après l'obtention du test virologique positif, patients à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie. **Ne pas utiliser si OMICRON**

a) Patient ne nécessitant pas d'oxygène du fait de la COVID-19, à initier moins de 5j après le début des symptômes

Dose unique de 600 mg de Casirivimab et 600 mg d'Imdevimab administrés en une seule perfusion IV après dilution

b) Patient hospitalisé du fait de la COVID-19 et séronégatif (IgG anti-S) nécessitant une oxygénothérapie non invasive

Dose unique de 4000 mg de Casirivimab et 4000 mg d'Imdevimab administrés en une seule perfusion IV après dilution

Casirivimab et Imdevimab doivent être administrés ensemble dans une même perfusion intraveineuse

3. Conservation des flacons

- Flacons fermés : entre +2°C et +8°C
- Flacons multidoses 20ml entamés : 16h à T° ambiante ou 48h max. entre +2°C et +8°C
- Après dilution dans la poche de NaCl : 4h à T° ambiante ou 24h au réfrigérateur (30mn à T° ambiante avant administration)

Mise à T° ambiante des flacons 20 mn avant préparation. Ne pas agiter

a) Patient ne nécessitant pas d'oxygénothérapie



posologie 600mg + 600mg
(volume total 10ml)
utiliser 2 seringues distinctes

b) Patient nécessitant une oxygénothérapie

posologie 4000mg + 4000mg
(volume total 66,6ml)
utiliser 2 seringues distinctes

Flacons de 20ml

Flacons de 6ml



*Retourner la poche
manuellement 10 fois,
sans agiter*

Tubulure perfusion + filtre 0,2µm (pompe ou gravité)

Perfusion de 30mn, débit 540ml/h
Rincer la tubulure
Surveillance 1h après la fin de la perfusion

Perfusion de 60mn, débit 317ml/h
Rincer la tubulure
Surveillance 1h après la fin de la perfusion