

ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS : RECOMMANDATIONS D'UTILISATION SELON LA FONCTION RENALE

| | | Apixaban (ELIQUIS®) | | | Dabigatran (PRADAXA®) | | | Rivaroxaban (XARELTO®) | | |
|---|----------------|--|----------|----------|--|--------|--|---|------------------------|----------|
| Indications | | FANV | TVP/EP | EDEV | FANV | TVP/EP | EDEV | FANV | TVP/EP | EDEV |
| Clairance de la Créatinine (ClCr) (Cockcroft) en mL/min | ClCr > 50 | Autorisé | | | Autorisé | | | Autorisé | | |
| | 30 ≤ ClCr < 50 | Autorisé | | | Adaptation posologique 110 mg x 2 fois/jour | | Adaptation posologique 150 mg x 1 fois/jour | Adaptation posologique 15 mg x 1 fois/jour | Adaptation posologique | Autorisé |
| | 15 ≤ ClCr < 30 | Adaptation posologique 2,5 mg x 2 fois/jour | Prudence | Prudence | Contre-indiqué | | | A partir de J22 : 15 mg x 1 fois/jour | Prudence | |
| | ClCr < 15 | Non recommandé | | | Contre-indiqué | | | Non recommandé | | |



Autorisé à posologie usuelle



Non recommandé ou déconseillé



Prudence/adaptations posologiques/surveillance



Contre-indiqué