

Vaccin à virus vivants atténués (3<sup>ème</sup> génération),  
suspension injectable de 0,5 mL, flacon unidose

### Indications

- immunisation active contre la variole chez les adultes
- en post-exposition dans la prévention spécifique contre l'infection au Monkeypox virus

### Conservation

Conditions stockage	Temps décongélation	Après décongélation
-80°C +/-10°C, à l'abri de la lumière	10 min environ	<u>Conservation entre +2° et +8°C max 14 jours à l'abri de la lumière</u>

Il n'est plus recommandé de stocker les flacons à -20°C.

Indiquer la date de péremption (date de passage entre 2° et 8°C +14 jours) sur les boîtes et les flacons dès sortie du congélateur.

Transport entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière.

### Schéma vaccinal en post-exposition

Dose **1** : idéalement entre J0 et J4 et jusqu'à J14 après le contact à risque.

Dose **2** : à 28 jours au moins après la 1<sup>ère</sup> dose et au maximum 42 jours après la 1<sup>ère</sup> dose.

Patients immunodéprimés : une 3<sup>ème</sup> dose est recommandée après un intervalle minimal de 28 jours.

Patients vaccinés contre la variole avant 1980 : administration d'une seule dose par IMVANEX®.

Les sujets immunodéprimés précédemment vaccinés doivent recevoir 2 doses de rappel.

### Modalités d'administration

 Tourner délicatement le flacon avant utilisation jusqu'à atteindre la température ambiante.

 Inspecter visuellement la suspension avant administration : en cas de présence de particules et/ou d'aspect anormal, le vaccin ne doit pas être administré et doit être éliminé.

 Administrer 0,5mL par **voie SC** (voie intravasculaire contre indiquée), aiguille 25G 16mm

### Précautions d'emploi

- Dermatite atopique : risque de symptômes locaux-régionaux plus marqués
- Hyperthermie : différer l'injection
- Eviter l'administration si grossesse ou allaitement par précaution, faute de données suffisantes
- Eviter l'administration concomitante avec d'autres vaccins ou immunoglobulines

### Contre-indication

- Hypersensibilité à :
- Trométamol
  - Protéines de poulet
  - Benzonase
  - Gentamicine
  - Ciprofloxacine

### Effets secondaires possibles de légers à modérés

Douleur au point d'injection, céphalées, fièvre (privilégier la prise de paracétamol)

**Administrations** à déclarer à l'ARS quotidiennement (fichier Excel)

**Effets indésirables** à déclarer via : [Portail de signalement des événements sanitaires indésirables](#)