

CONSULTATIONS PHARMACEUTIQUES

POUR LES PATIENTS SOUS
ANTICANCÉREUX ORAUX

Mise en place au CH de Martigues

2017

Dr Eric GERARDIN

Dr Thierry BEROD



Conflit d'intérêts ...



Développement et recours aux anticancéreux oraux



Nombre cumulé de molécules per os ayant une AMM




FIGURE 3: Nombre de molécules par voie orale ayant une AMM

50% des
chimiothérapies en
2020 ?



Nouveaux besoins

→ Prise en charge devenue ambulatoire, mais ...

- Traitements spécifiques, peut être inusuels pour la ville
- Voie orale moins toxique ?
-
-

→
ora

Consultation Pharmaceutique?

ies

2014-2017

Prescription
et
dispensation

Observance

Suivi
thérapeutique


Contact
(médecins,
pharmacien, IDE,
famille)

Matériel & Méthode


- Depuis janvier 2017, mise en place d'une consultation pharmaceutique pour les patients sous anticancéreux oraux au CHM
- Quels patients ciblés ?
 - Tous
- Quels anticancéreux oraux ciblés ?
 - Tous
- Où et quand ?
 - Hospitalisation Conventionnelle
 - HDJ
 - Consultation



- Comment se déroulent les consultations pharmaceutiques ?



relai d'information
au pharmacien
d'officine référent



N° dossier : Effectué le : Par :
 du patient :

Primo prescription : oui / non Durée de l'entretien : mois

Initiation : HDJ Hospitalisation Consultation

PATIENT

NOM : Prénom :
 AGE : SEXE : M / F Poids : kg
 Tél : ADRESSE :
 Situation familiale :
 sans emploi : oui / non
 isolé : oui / non
 Profession :

PROFESSIONNELS DE SANTE

oncologue	Dr	Adresse :	Tél :
			Mail :
Médecin traitant	Dr	Adresse :	Tél :
			Mail :
Médecin spécialiste	Dr	Adresse :	Tél :
			Mail :
Pharmacie de référence	Dr	Adresse :	Tél :
			Fax :
			Mail :
Pharmacie de secours		Adresse :	Tél :
			Mail :
Librairie		Adresse :	Tél :
			Mail :
Autre		Adresse :	Tél :
			Mail :

REMARQUES

Autorisation de RVV :	Oui	Non
Autorisation pour chemises médicamenteuses :	Oui	Non
Autorisation pour des médicaments à usage dérogatoire :	Oui	Non
consultations téléphoniques :	Oui/Non	à préciser
Consultations préférencielles :	Bonnes	Moyennes
Perceptions de la réalité et du traitement :	Bonnes	Moyennes
Soutien social :	Oui	Non
Dépendance d'un fiche d'information patient :	Oui	Non

PHYSIOPATHOLOGIE

diagnostic principal
comorbidités
antécédents médicaux
antécédents chirurgicaux
Allergies	Oui / Non ; préciser :
Antibiotiques	Oui / Non ; préciser :

TRAITEMENT

chimiothérapie per os jour pendant : jours					
Protocole curatif	Oui / Non ; préciser :					
Antécédents de chimiothérapie					
Inchiments associés	Medicament	MuCh	MIG	Sol	Nut	Remarque
					
					
					
					
Autosubstitution	Oui / Non ; préciser :					
Questions & remarques					
					
					
					
					

HYCAMTIN®

Tegafur

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en oncologie. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

INDICATIONS ET CARACTERISTIQUES

Deux prises
-boîte de 30
-boîte de 30
-boîte de 30
-boîte de 30
-boîte de 30

FORME HYCAMTINE PASTILLES

version de janvier 2016

Prise	Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30	Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30
Prise d'essai	Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30	Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30 Boîte de 30 ou boîte de 30

Une partie de l'analyse peut varier, pour la faciliter vous pouvez utiliser une version écrite en lettres ou des lettres, par exemple et odentia, utilisez un algorithme deux. Les choses ressemblent à l'ordre de la classification.

Les choses de ces études, les choses de ces études doivent avoir, pour ces recommandations, les choses de ces études.

INDICATIONS AUX PATIENTS

Les pilules d'HYCAMTIN® doivent être prises **à jeun**, à l'aide d'un verre d'eau, en une prise par jour et ne doivent pas être mâchées, dissoutes ou coupées. Elles peuvent être prises pendant ou au début des repas.

Ne prenez pas d'HYCAMTIN® pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace pendant le traitement.

Ne fumez pas pendant le traitement et évitez toute consommation de tabac.

Ne prenez pas d'HYCAMTIN® pendant le traitement et évitez toute consommation de tabac.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

Ne jetez pas les emballages ni les pilules dans votre poubelle. Rappez-les à votre pharmacien.

FORME HYCAMTINE PASTILLES

-2-

version de janvier 2016

TARCEVA®

ce médicament est utilisé pour traiter le cancer du poumon.

PRESENTATION

Comprimés de couleur blanche à jeun (50, 100 et 150 mg). Disponible sous les noms de marque suivants.

MODE D'ADMINISTRATION

Les comprimés de "tarceva" sont à prendre avec un verre d'eau, 1 heure avant les repas ou 1 heure après les repas. Ils doivent être pris à jeun, à l'aide d'un verre d'eau, 1 heure avant les repas ou 1 heure après les repas. Ils doivent être pris à jeun, à l'aide d'un verre d'eau, 1 heure avant les repas ou 1 heure après les repas.

EFFETS SECONDAIRES

Ce médicament peut provoquer des effets secondaires, qui peuvent être :
- fatigue ou essoufflement
- douleurs musculaires
- diarrhée ou constipation
- perte d'appétit
- nausées
- vomissements
- douleurs abdominales
- éruptions cutanées
- infections
- saignements
- problèmes de vision
- problèmes de goût
- problèmes de goût
- problèmes de goût

Vous pouvez ressentir d'autres effets que ceux listés dans ce document, par exemple des effets secondaires.

- Effets secondaires possibles : fatigue, douleurs musculaires, diarrhée, constipation, perte d'appétit, nausées, vomissements, douleurs abdominales, éruptions cutanées, infections, saignements, problèmes de vision, problèmes de goût, problèmes de goût.
- Précautions : ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre d'autres médicaments sans avis médical, éviter les rayons UV, éviter les infections.

ERLOTINIB TARCEVA®

Voire traitement au quotidien

Cette notice ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Recommandations générales

ANABERSE - ALLATEMBIT

Après tout traitement, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, une méthode contraceptive efficace doit être utilisée. Les femmes traitées par l'ANABERSE doivent utiliser une contraception.

VALCICLOVIR

Les infections peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement sont recommandés avant et au cours de celui-ci.

HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie, à savoir d'un traitement antiparasitaire.

MEDICAMENTS ASSOCIÉS

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie, à savoir d'un traitement antiparasitaire.

AUTRES REMARQUES

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie, à savoir d'un traitement antiparasitaire.

Protocole REVLMID Dexaméthasone

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole REVLMID-Dexaméthasone.

Ce protocole comprend l'administration de 2 médicaments : REVLMID® Lénilidomide Dexaméthasone

Le REVLMID® est administré par voie orale, une fois par jour, pendant 21 jours consécutifs suivis d'une semaine d'arrêt.

La Dexaméthasone est administrée par voie orale, à par séquences de quelques jours en prise unique hebdomadaire.

Le REVLMID® et la Dexaméthasone sont administrés en même temps.

Vous devez être suivi par votre médecin pendant le traitement. Le suivi peut être suivi de votre médecin pendant le traitement.

- Ne pas fumer pendant le traitement et évitez toute consommation de tabac.
- Ne pas prendre d'autres médicaments sans avis médical.
- Évitez les infections pendant le traitement.
- Évitez les infections pendant le traitement.

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie, à savoir d'un traitement antiparasitaire.

Bilan d'étape




Nous avons réalisé une évaluation basée sur :

- le nombre de patient
- le nombre et la durée des consultations
- le type d'anticancéreux prescrit
- le nombre de fiches d'information patient dispensés
- le nombre d'interventions pharmaceutiques
- le feedback aux oncologues et pharmaciens d'officine

Résultats


- **30 patients**
- **36 consultations**
 - 5 patients 2 consultations
 - 1 patient 3 consultations
- **Age moyen = 68 ± 12 ans**
- **Durée moyenne des primo consultations = 33,9 ± 12,3 min**
- Une fiche d'information a été remise systématiquement lors de la première consultation, excepté pour 4 patients (illettrisme, asthénie)



Résultats


- 13 anticancéreux différents
- Sur les 36 consultations menées
 - 16 étaient en lien avec un IMID
 - 20 anticancéreux sont actuellement délivrés en ville

Anticancéreux oraux rencontrés lors des consultations pharmaceutiques



Résultats

- **30 problèmes médicamenteux** ont été relevés lors des consultations pharmaceutiques



Feedback :

- **17 interventions pharmaceutiques** transmises aux oncologues, dont 15 ont été acceptées
- **6 Pharmacies d'officine** ont été contactées pour la transmission d'informations relatives au traitement et au patient

Discussion

① **Tendre vers un suivi systématique**

- Fréquence des consultations par patient ?
- Suivi par un pharmacien ou par une équipe pluridisciplinaire ?
- Entretien physique, téléphonique, visioconférence ou mail ?

② **Evaluer l'adhérence au traitement des patients**

- Plutôt l'observance ?
- Quand ? Au bout de combien de temps ?
- Quel outil ? Questionnaire Ameli⁽¹⁾ ? Autres : pilulier, Abilify MyCite ... ?

③ **Développer la collaboration avec les pharmaciens d'officine**

- Réunion prévue entre pharmaciens hospitaliers, officinaux du bassin et URPS
- Systématiser la transmission d'information : tel, mail sécurisé ?

Conclusion

- L'avènement des anticancéreux oraux est un challenge pour les pharmaciens hospitaliers et officinaux
- Le monitoring des patients bénéficiant d'un anticancéreux oral est crucial
- En collaboration avec les autres soignants, les consultations pharmaceutiques pour les anticancéreux oraux doivent être développées pour garantir la sécurité et l'efficacité du traitement

MERCI

