

Vaccin à virus vivants atténués (3<sup>ème</sup> génération), suspension injectable de 0,5 mL, flacon unidose  
IMVANEX® et JYNNEOS® sont interchangeables

## Schémas d'administration :

### Pré-exposition au virus Monkeypox

- 2 doses
- Intervalle : 28 jours minimum
- 1 seule dose si patient déjà vacciné contre la variole

#### Personne VIH (non déjà vaccinée)

- CD4 > 200 : 2 doses
- CD4 < 200 : 3 doses

**Personne immunodéprimée (non VIH) : 3 doses**

### Post-exposition au virus Monkeypox

- 2 doses :
  - 1<sup>ère</sup> dose : idéalement entre J0 et J4 et jusqu'à J14 après le contact à risque
  - 2<sup>ème</sup> dose : intervalle de 28 jours minimum après la 1<sup>ère</sup> dose
- 1 seule dose si patient déjà vacciné contre la variole
- Immunodéprimé : 3 doses ou 2 si déjà vacciné contre la variole

## Conservation

Conditions stockage	Temps décongélation	Après décongélation
-80°C +/-10°C, à l'abri de la lumière	10 min environ	<p>Conservation 56 jours (8 semaines) à l'abri de la lumière sans dépasser la date de péremption à -20°C inscrite sur la boîte</p> <p>Conservation 14 jours (2 semaines), à l'abri de la lumière si la date de péremption en -20°C est dépassée, sans dépasser la date de péremption à -80°C</p> <p><b>lot P00027 : 14 jours (2 semaines) sans dépasser la date de péremption à -80°C</b></p>

Indiquer la date de péremption sur les boîtes et les flacons dès sortie du congélateur.  
Transport entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière.

## Modalités d'administration

 Tourner délicatement le flacon avant utilisation jusqu'à atteindre la température ambiante.

 Inspecter visuellement la suspension avant administration : en cas de présence de particules et/ou d'aspect anormal, le vaccin ne doit pas être administré et doit être éliminé.

 Administrer 0,5mL par voie SC (voie intravasculaire contre indiquée), aiguille 25G 16mm

## Précautions d'emploi

- Dermatite atopique : risque de symptômes locaux-régionaux plus marqués
- Hyperthermie : différer l'injection
- Eviter l'administration si grossesse ou allaitement par précaution, faute de données suffisantes
- Eviter l'administration concomitante avec d'autres vaccins ou immunoglobulines

## Contre-indication

- Hypersensibilité à :
- Trométamol
  - Protéines de poulet
  - Benzonase
  - Gentamicine
  - Ciprofloxacine

## Effets secondaires possibles de légers à modérés

Douleur au point d'injection, céphalées, fièvre (privilégier la prise de paracétamol)