





## Conservation

 **- 80°C** Stable **jusqu'à péremption** (12 mois)


**Durée de décongélation**  
 10 flacons : **6h** entre +2 et + 8°C  
 1 flacon : **30mn** à T° ambiante (<30°C)

 Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**  
 Stable maximum **10 semaines** après réception (dans la limite des 12 mois de péremption)  
**A conserver à l'abri de la lumière**, dans sa boîte d'origine

 **Ne pas recongeler**

Stable **24h** entre **+8° à +30°C**

## Contrôles

 Flacon 2,25 mL, **6 doses**  
**Capsule amovible grise**

Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, sans particule visible


**Prêt à l'emploi, ne pas diluer**




**Mélanger délicatement** en **retournant** le flacons à 10 reprises avant utilisation

**Ne pas secouer**

Comirnaty® bivalent **est indiqué** chez les personnes ayant reçu au moins un schéma de primo-vaccination contre la Covid-19. Cette forme n'est destinée qu'au **rappel** vaccinal.


## Administration

 1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM

 Solution **2,25 mL**  
 Seringue 1 mL  
 Aiguille 25G  
 6 Doses **0,3 mL**



Durée de transport maximale : 6h entre +2° et +30°C

 Une fois le flacon percuté, stable **12h** entre **+2 et +30°C** (durée de transport incluse)

 **Jeter le flacon après ce délai**

 **Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose**

## Traçabilité

- Noter la **date et l'heure de sortie du congélateur**
- Noter la **date et l'heure de sortie du réfrigérateur**
- Noter la **date et l'heure du 1<sup>er</sup> percutage du flacon**