

Indication	Prophylaxie préexposition (AMMc)	Curatif (AAP post AMM)
Population cible	Adultes ou adolescent > 12 ans et > 40 kg à haut risque de forme sévère	Adulte ou enfant > 12 ans et > 40 kg à haut risque de forme sévère
	En cas de souche de SARS-CoV-2 sensible, patient ayant un déficit de l'immunité lié à une pathologie ou à des traitements et faiblement ou non répondeurs après un schéma vaccinal complet ou sujet non éligible à la vaccination	Patient ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la Covid-19, <u>sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2</u> et lorsque les alternatives ne peuvent être utilisées en raison de contre-indications
Précautions d'emploi	Prudence avant d'envisager l'administration chez les patients à haut risque d'évènements cardiovasculaires. Si signes ou symptômes évocateurs d'un évènement cardiovasculaire, consulter immédiatement	Non recommandé si risque d'évènements cardiovasculaires et/ou thromboemboliques
Biologie		Test antigénique ou RT-PCR positif
Posologie	1 ^{ère} dose : 300mg + 300mg (3ml + 3ml)	Administration dans les 7j suivant apparition des symptômes 300mg + 300mg (3ml + 3ml)
	Renouvellement (après 6 mois): 300mg + 300mg	
Mode administration	IM en 2 points distincts, dans 2 muscles différents (de préférence dans les muscles glutéaux)	
Surveillance	30mn après administration	
Prise en charge	Prescription initiale hospitalière HDJ, HAD, Cons Ext	