

PAXLOVID® comprimés, antiviral

Composition : nirmatrelvir 150 mg (cp rose) + ritonavir 100 mg (cp blanc)

Indications : Traitement curatif de 1^{ère} intention pour:

- Les patients porteurs d'une immunodépression, quel que soit leur âge et leur statut vaccinal
- Les patients présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère, quel que soit leur âge
- Les patients > 65 ans quel que soit le statut vaccinal
- Les patients > 60 ans avec un schéma vaccinal incomplet

PAXLOVID doit être administré dès que possible après le diagnostic positif à la COVID-19 (test RT-PCR nasopharyngé ou antigénique), et au maximum dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes.

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745084>

Possibilité de délivrer une ordonnance dite de « dispensation conditionnelle » (durée de validité ≤ 3 mois).

Contre-indications :

- insuffisance hépatique sévère ;
- insuffisance rénale sévère ;
- prise de médicaments puissants inducteurs ou dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A.

PAXLOVID® n'est pas recommandé pendant la grossesse.

En cas de contre-indication médicamenteuse, PAXLOVID® peut être administré uniquement si les traitements concomitants peuvent être interrompus.

La Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT) propose des recommandations thérapeutiques dans le cadre d'associations de médicaments avec le Paxlovid® : <https://sfpt-fr.org/recospaxlovid>

Dans les situations complexes :



Posologie :

2 comprimés de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir, à prendre en même temps, toutes les 12 heures, pendant 5 j.

A prendre avec ou sans nourriture. Avaler les comprimés entiers et non mâchés, non cassés ni écrasés.

En cas d'insuffisance rénale modérée, la posologie doit être adaptée :

- 1 seul comprimé de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir, toutes les 12 heures.

En cas d'oubli d'une dose :

- Dans les 8h qui suivent la prise théorique oubliée : prendre la dose puis reprendre le schéma posologique normal
- Si délai est supérieur à 8h, ne pas prendre la dose oubliée et prendre la dose suivante à l'heure prévue
- Ne pas doubler une dose pour compenser une dose oubliée.