

Pour pallier la rupture des spécialités pédiatriques d'amoxicilline les médecins peuvent prescrire directement une préparation magistrale selon les [monographies](#) et fiches d'utilisation disponibles sur le site de l'ANSM :

- Gélules d'amoxicilline 125mg : [fiche d'utilisation](#)
- Gélules d'amoxicilline 250mg : [fiche d'utilisation](#)

en respectant les [recommandations de juste prescription](#) (ANSM / GPIIP / SFP / AFPA / SPILF)

Identification du prescripteur

Dr NOM Prénom

Adresse

N° de téléphone

N° RPPS

FINESS + Identification de l'établissement
si prescripteur hospitalier

Date de prescription

Identification du patient

NOM Prénom

Age : Né(e) le xx/xx/xx

Poids : xx kg

DCI + dosage + forme + galénique

Fréquence de prise et durée de traitement

Ex : Amoxicilline 250 mg gélule

1 gélule toutes les 12 heures pendant 5 jours

Préparation magistrale à but thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente disponible.

Signature et cachet du prescripteur

Modalités d'administration selon la fiche utilisation à remettre lors de la dispensation

- Ouvrir la gélule
- Mélanger avec une cuillère à café d'eau, d'eau sucrée ou un peu d'aliments sucrés (compote, yaourt), afin d'atténuer le goût un peu amer du médicament
- Remuer jusqu'à ce que le mélange soit homogène avant administration
- S'assurer que l'enfant ait bien tout avalé

En gras : Mentions obligatoires devant figurer sur l'ordonnance