



COMIRNATY® LP.8.1 (30 mcg/dose), adulte et enfant ≥ 12 ans

Conservation



- 80°C Stable jusqu'à péremption,
à l'abri lumière

Durée de décongélation

10 flacons : **6h** entre +2 et +8°C

1 flacon : **30mn** à T° ambiante (<30°C)



Ne pas recongeler



Au réfrigérateur entre +2 à +8°C

Stable maximum **10 semaines** après réception
(dans la limite de la péremption)

Mettre à jour la date de péremption sur l'emballage

A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine

Stable 12h entre +8° à +30°C

Contrôles



Flacon 2,25 mL; **6 doses**

Capsule amovible **gris foncé**

Dispersion de couleur blanche à blanc cassé,
sans particule visible **après mélange**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Mélanger délicatement en retournant le
flacon à 10 reprises avant utilisation

Ne pas secouer

Ne pas utiliser si présence de particules ou
coloration anormale

Posologie : 1 dose annuelle (éligibilité au moins
3 mois après la dernière injection)

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM
6 doses par flacon



Solution
2,25 mL



Seringue 1 mL
Aiguille sertie



6 Doses
0,3 mL



Ne pas mélanger dans la même seringue avec
un autre vaccin ou médicament



**Ne pas utiliser plusieurs flacons pour
constituer une dose**

Durée de transport maximale : 6h entre +2° et +30°C



Une fois le flacon percuté,
stable **12h** entre **+2 et +30°C**
(durée de transport incluse)

Conservation **optimale** entre **+2 et +8°C**



Jeter le flacon après ce délai

Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure** de sortie du congélateur
- Noter la **date** et l'**heure** de sortie du réfrigérateur
- Noter la **date** et l'**heure** du 1^{er} percutage du flacon