



COMIRNATY® LP.8.1 (10 mcg/dose), enfant de 5 à 11 ans

Conservation

 **- 80°C** Stable **jusqu'à péremption**,
à l'abri lumière

Durée de décongélation
10 flacons : **6h** entre +2 et +8°C
1 flacon : **30mn** à T° ambiante (<30°C)

 **Ne pas recongeler**

 **Au réfrigérateur entre +2 à +8°C**
Stable maximum **10 semaines** après réception
(dans la limite de la péremption)
Mettre à jour la date de péremption sur l'emballage
A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine
Stable 12h entre +8° à +30°C

Contrôles

  Flacon 2,25 mL ; **6 doses**
Capsule amovible **bleu foncé**

Dispersion limpide à légèrement opalescente,
sans particule visible **après mélange**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Mélanger délicatement en retournant le
flacon à 10 reprises avant utilisation


Ne pas secouer

Ne pas utiliser si présence de particules ou
coloration anormale

Posologie : 1 dose annuelle (éligibilité au moins
3 mois après la dernière injection)

Administration

 1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM
6 doses par flacon





Ne pas mélanger dans la même seringue avec
un autre vaccin ou médicament

 **Ne pas utiliser plusieurs flacons pour
constituer une dose**

Durée de transport maximale : 6h entre +2° et +30°C

 Une fois le flacon percuté,
stable **12h** entre **+2 et +30°C**
(durée de transport incluse)

Conservation **optimale** entre **+2 et +8°C**

 **Jeter le flacon après ce délai**

Traçabilité

- Noter la **date et l'heure de sortie du congélateur**
- Noter la **date et l'heure de sortie du réfrigérateur**
- Noter la **date et l'heure du 1^{er} percutage du flacon**