



Antiagrégation et anticoagulation dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)

La prise en charge repose sur 2 piliers :

- **Mesures hygiéno-diététiques** : perte de poids et régime alimentaire équilibré, soins préventifs des pieds, traitement des plaies et infections, déchargement de pression, exercice physique supervisé, arrêt du tabac, vaccination Influenzae et SARS-CoV-2
- **Traitements médicamenteux** :
 - **Antiagrégant plaquettaire**
 - Antihypertenseur : IEC ou ARA II
 - ± prise en charge diabète avec contrôle optimal de la glycémie
 - Hypolipémiant


Classe I : recommandé(e)/indiqué(e)
Classe IIa : à considérer
Classe IIb : peut être envisagé
Classe III : non recommandé(e)

Antiagrégant plaquettaire


AOMI asymptomatique : **Traitement antithrombotique non recommandée en systématique sans signes de maladie CV athéroscléreuse (classe III)**; envisageable si patient diabétique (classe IIb)

AOMI symptomatique (claudication, ischémie chronique menaçant le membre)

Absence de revascularisation récente



Revascularisation récente



^aRisques ischémiques : antécédent d'amputation, ischémie chronique menaçant un membre, antécédent de revascularisation, comorbidités à haut risque (insuffisance cardiaque, diabète, maladie vasculaire touchant au moins deux territoires vasculaires, DFG < 60 mL/min/1,73 m²)

^bClopidogrel (75 mg/j) légèrement plus efficace que l'aspirine (75-325 mg/j) (étude CAPRIE)
 Ticagrelor en routine non recommandé : efficacité similaire au clopidogrel mais effets indésirables plus importants (étude EUCLID)

Association aspirine 100 mg + rivaroxaban 2,5 mg x 2/j :
 - Recommandations européennes 2024
 - HAS 2022 : remboursement réservé aux AOMI sévères (IPS : 0,4-0,7) uniquement après revascularisation



Sources

2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases
 2024 ACC/AHA/AACVPR/APMA/ABC/SCAI/SVM/SVN/SVS/SIR/VES Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines
 VIDAL Recos : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, 2025